

採血・点滴を受けられる患者さまへ

ご本人確認

「採血取り間違い防止」のため、お名前と生年月日をお伺いしています。

下記に該当する患者さまは採血スタッフにお申し出ください。

- 採血時に気分の悪くなられる方、緊張しやすい方
- 消毒液(アルコール)や手袋(ラテックス)にアレルギーをお持ちの方
- 血液透析中の方
- 乳房の手術を受けられた方
- 血液を固まりにくくするお薬を服用されている方
- その他採血に関して、ご希望・ご不安がある方



採血に伴う合併症について

採血は病気の診断や治療効果をみるためにも必要な医療行為です。比較的に安全性の高い手技で細心の注意を払って実施していますが、以下に示すような合併症を生じることがあるとされています。以上の点をご理解の上、採血を受けられるようお願いいたします。また、採血に伴う合併症が生じた場合、治療にかかる医療費は通常の保険診療扱いとなりますのでご了承ください。

皮下出血(内出血)・止血困難

主に採血後の止血が不十分な場合に生じます。針を刺した場所を **5分ほどしっかり押さえて** 予防してください。**内出血があってもほとんどが1～2週間ほどで自然に治ります。**



神経損傷

採血後も手指へひろがる痛みや、しびれが持続することがあります。**採血後に手や指にひろがる痛み・しびれなどが続く場合はすぐにお申し出ください。**1万回～10万回の採血に1回程度の頻度で起こり1週間～3か月くらいで症状は消失すると言われています。

血管迷走神経反応

採血中や採血後に一時的に血圧が低下し、めまいや気分不良、意識消失などを引き起こします。10～30分程度横になって安静にて様子を見ます。



アレルギー

採血の時に使用する消毒液やスタッフの手袋(ラテックス)により、アレルギー反応をきたす場合があります。



ご不明な点について

ご不明な点、心配なことがありましたら遠慮なくスタッフにお聞きください。

